

لقب:

تاريخ الولادة:

ورقة تعليمية عن اللولب ( الهرموني )

- التأثيرات الهرمونية ( البروجستين ، بدون إستروجين ) موضعية بشكل رئيسي
- يصبح المخاط في عنق الرحم أكثر سمكاً ولا يمكن للحيوانات المنوية اختراق الرحم
- بطانة الرحم تتراكم بشكل أقل ، وهذا يمنع انغراس البويضة المخصبة
- حدوث التبويض
- مؤشر اللؤلؤ (0.16) 1-2 امرأة من كل 1000 امرأة تحمل كل عام
- وقت التركيب : الإزالة المبكرة ممكنة في أي وقت Jaydess® سنوات 3 - 5 ، Kyleena® و Mirena®

متى وكيف يتم تركيب اللولب؟

قبل التركيب: فحص أمراض النساء ، نتائج غير واضحة للكشف المبكر عن السرطان (بعد أقصى سنة واحدة) ، إذا لزم الأمر، مسحة الكلاميديا الحالية

إلتركيب / تغيير أثناء الحيض:

يتم فحص وقياس الجزء الداخلي من الرحم بواسطة مسبار. يتم إدخال من خلال عنق الرحم إلى الرحم بمساعدة أنبوب إدخال رفيع (اداه طبيه ) ، حيث يتكشف ويعمل على الفور.

بعد التركيب ، يتم تقصير خيط الاسترجاع إلى حوالي 2 سم. ثم يتم فحص الملاءمة الصحيحة بالموجات فوق الصوتية جهاز لايكو

الآثار الجانبية والمضاعفات

الألم من الممكن حدوث آلام مؤقتة في البطن أو الظهر في الأيام القليلة الأولى بعد الوضع .

نزيف الدورة الشهرية بعد التبضع والنزيف ما بين الحيض أمراً شائعاً في الأشهر القليلة الأولى ، ولكن من المرجح أن ينخفض نزيف الحيض أو قد يتوقف

الالتهاب إن مخاطر الإصابة بالتهاب البطن أعلى قليلاً بشكل عام. يجب أن يبدأ العلاج في أسرع وقت ممكن في حالة ظهور أعراض مثل آلام الحوض أو الحمى غير الواضحة أو الإفرازات المتغيرة .

الخلع في بعض الأحيان يمكن أن ينزلق الملف. يحدث هذا من خلال تقلصات عضلات الرحم. لا يمكن أن تنزلق اللولب من خلال العمل البدني الشاق أو الرياضة أو الاتصال الجنسي مع ذلك فإننا ننصح بعدم استخدام ليدي كوب الدورة الشهرية لانو يؤدي إلى انزلاق اللولب

تحدث نكيسات المبيض في كثير من الأحيان ، ولكنها عادة ما تتراجع من تلقاء نفسها ونادراً ما تتطلب العلاج


ثقب نادرا جدا (1/1000 امرأة) يمكن أن تحدث إصابة في الرحم أثناء الإدخال. لذلك قد يكون من الضروري إجراء عملية جراحية وإذا حدث الحمل على الرغم من وجود اللولب ، فيجب استشارة طبيب أمراض النساء في أسرع وقت ممكن لمناقشة كيفية المتابعة.

خطر الحمل خارج الرحم أعلى قليل الحمل إذا كنت ترغبين في الإنجاب ، أزل اللولب من قبل طبيبك ؛ الحمل ممكن بعد الإزالة مباشرة.

الآثار الجانبية الهرمونية مع هرمون اللولب ، يمكن أن تحدث تغيرات في المزاج في حالات نادرة ، ونادراً ما يحدث الاكتئاب أو حتى انخفاض في المتعة وتغيرات الوزن .

### ضوابط الموجات فوق الصوتية جهاز الايكو

يتم إجراء الفحص الأول بعد أسبوع واحد من التركيب. بعد ذلك ، يجب أن يقوم طبيب أمراض النساء بإجراء فحوصات منتظمة كل 6 أشهر



السيدة الدكتور \_\_\_\_\_ أجرى محادثة تعليمية معي.

أؤكد أنني قد أبلغت تماماً بوسائل منع الحمل المخطط لها باستخدام اللولب ، والإجراء المتضمن ، والمخاطر والمضاعفات المحتملة ، فضلاً عن فعاليتها. تم توضيح أسئلتي في هذا الصدد بشكل كامل. أوافق بموجب هذا على إدخال هرمون اللولب.

التاريخ توقيع المريض

تمت مناقشة الإجراء مع المريض وتوضيح الأسئلة وتقديم محضر لمعلومات المريض .

