

Impfkalender

für Säuglinge, Kinder und Jugendliche

gemäß den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission

(STIKO Stand: August 2020)

am Robert Koch-Institut (§ 20 Abs. 2 Infektionsschutzgesetz)

| Impfung | Alter in Wochen | Alter in vollendeten Monaten | | | | | Alter in Jahren | | |
|-----------------------------------|-----------------|------------------------------|---|-----|---|-----------------------|-----------------|-----|------|
| | | 6 | 2 | 3 | 4 | 11-14 | 15-23 | 5-6 | 9-17 |
| Tetanus° | | | x | (x) | x | x | | x | x |
| Diphtherie° | | | x | (x) | x | x | | x | x |
| Pertussis° | | | x | (x) | x | x | | x | x |
| Hib° | | | x | (x) | x | x | | | |
| Poliomyelitis° | | | x | (x) | x | x | | | x |
| Hepatitis B° | | | x | (x) | x | x | | | |
| Pneumokokken° | | | x | (x) | x | x | | | |
| Rotaviren °° | x | | x | x | | | | | |
| Meningokokken C | | | | | | x (nach 1.Geburtstag) | | | |
| Masern, Mumps, Röteln, Windpocken | | | | | | x | x | | |
| HPV °°° | | | | | | | | | x |

° Pneumokokken und Sechsfach-Impfstoff: Frühgeborene erhalten eine zusätzliche Impfstoffdosis im Alter von 3 Monaten (d.h. insgesamt 4 Dosen)

°° Rotaviren: Die 1. Impfung sollte bereits ab dem Alter von 6 Wochen erfolgen, je nach verwendetem Impfstoff sind 2 bzw. 3 Dosen im Abstand von mind. 4 Wochen erforderlich

°°° HPV: Mädchen und Jungen im Alter von 9-14 Jahren HPV-Grundimmunisierung mit 2

Dosen im Abstand von mind. 5 Monaten, bei beginnender Nachholimpfung im Alter >14 Jahren oder bei einem Impfabstand von < 5 Monaten zwischen 1. und 2. Dosis ist eine 3. Dosis erforderlich.

Unabhängig von den o.g. Terminen sollte, wann immer ein Arztbesuch erfolgt, die Impfdokumentation überprüft und fehlende Impfungen nachgeholt werden.

Ab dem 18. Lebensjahr wird alle 10 Jahre eine Auffrischung der Td-Impfung empfohlen.

Für alle Erwachsenen wird empfohlen, die nächste fällige Td-Impfung einmalig als Keuchhustenkombinationsimpfung zu verabreichen (Tdap- bzw. Tdap-IPV-Impfstoff). Jede Auffrischimpfung mit Td (auch im Verletzungsfall) sollte Anlass sein, eine mögliche Indikation einer Keuchhustenimpfung zu überprüfen und gegebenenfalls einen Kombinationsimpfstoff (Tdap) einzusetzen (z.B. Frauen mit Kinderwunsch präkonzeptionell, enge Haushaltskontaktpersonen (Eltern, Geschwister) und Betreuer (Tagesmütter, Babysitter, ggf. Großeltern) möglichst 4 Wochen vor der Geburt des Kindes, Personal in Gemeinschaftseinrichtungen für das Vorschulalter).

Masern: einmalige Impfung für alle nach 1970 geborenen Personen >18 Jahre mit unklarem Impfstatus, ohne Impfung oder mit nur einer Impfung in der Kindheit, mit einem MMR-Impfstoff.

In Berlin wird über die STIKO-Empfehlungen hinaus die Masernschutzimpfung auch für Personen die vor 1970 geboren sind öffentlich empfohlen. Außerdem wird die Masernimpfung für Säuglinge ab dem vollendeten neunten Lebensmonat bei Gefährdung durch eine entsprechende epidemiologische Situation öffentlich empfohlen.

Influenza: in Berlin wird über die STIKO-Empfehlungen hinaus die Influenzaschutzimpfung für alle Altersgruppen empfohlen.

Weitergehende Informationen im Internet unter www.rki.de