

Jahreszeit Monat	Winter		Frühjahr			Sommer			Herbst	
	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November
	Überwinterung**									Überwinterung**
<b>Waldgärtner in Berlin</b>										
Käfer ♂ ♀	☞ ☞ ☞ ☞ ☞ ☞	☞ ☞ ♂ ♀ ♂ ♀	♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀	♂ ♀ ♂ ♀ ☞ ☞	☞ ☞ ☞ ☞ ☞ ☞	• • • •	• • • •	☞ ☞ ☞ ☞	☞ ☞ ☞ ☞	☞ ☞ ☞ ☞
Ei •	Eiablage unter der Rinde		• • • •	• • • •						
Larve ■	Larvenfraß unter der Rinde		■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■					
Puppe ⊖			Puppe im Holz			⊖ ⊖ ⊖ ⊖	⊖ ⊖			
Reifungsfraß Jungkäfer ☞					Reifungsfraß ☞ ☞		☞ ☞ ☞ ☞	☞ ☞ ☞ ☞	☞ ☞ ☞ ☞	
Überwinterung** ☞	☞ ☞ ☞ ☞ ☞ ☞	☞ ☞ ☞ ☞						Überwinterung überwiegend in Überwinterungsgängen		☞ ☞ ☞ ☞
Kontrolle	visuell		Bohrmehl, Brutbilder			Kronenabsprünge				
	Pheromonfalle		Falle							
Maßnahmen	chemisch		Stammstreichung							
Monat	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November

\* **Geschwisterbrut:** bei günstiger Witterung kann das Weibchen nach einem Reifungsfraß erneut Eier ablegen, deshalb oft mehrere Entwicklungsstadien zeitgleich

\*\* **Überwinterung:** je nach Entwicklungsstadium im Brutbild oder in Überwinterungsfraßgängen





